

PLUS TRAP · Atrayentes



Descripción

Plus Trap® es un cebo libre de insecticidas listo para usar con un poderoso atrayente para *Ceratitis capitata* y *Anastrepha spp* que mediante la emisión de compuestos volátiles ejerce una poderosa atracción, sobre todo en hembras de las especies, que son atraídas hacia el interior de la trampa y al no poder escapar mueren por ahogamiento en su interior.

Contiene Trimetilamina e hidrolizado de proteínas.

Características

- ▶ **Específico.** Plus Trap® es un atrayente alimenticio específico para *Ceratitis Capitata* y *Anastrepha spp* de elevado contenido proteico que ejerce un elevado poder de atracción sobre todo en hembras.
- ▶ **Limpio.** Plus Trap® es un producto biológico libre de insecticidas. Apto para utilizar en producción orgánica.
- ▶ **Listo para usar.** Plus Trap® no es necesario diluir, ni agregar otros productos.
- ▶ **Económico.** Plus Trap® permite el recebado de las trampas mediante su bidón de recarga económica.
- ▶ Tiene una duración de **más de 30 días** (dependiendo de las condiciones climáticas)
- ▶ De **toxicidad baja**.

Packaging Estándar

Caja por 24 trampas (960 trampas por pallet de 1m x 1,20m x 2m).
Bidón de recarga económico de 20 l. (válvulas dosificadoras también disponibles).

Forma de Uso

Plus trap® se encuentra listo para usar. No es necesario agregar aditivos ni diluir el producto, se debe quitar la faja, colgar del árbol y listo.

La cantidad de **Plus trap®** por hectárea dependerá de la presión, dinámica de la plaga y tipo de cultivo a proteger con un mínimo de 70 trampas por hectárea.

En la disposición de las trampas se deberá prestar especial atención a la dinámica de la plaga dentro del predio, reforzando en los lugares donde se detecte mayor presión.

Colgar **Plus trap®** a 1,5 m. del suelo en la parte soleada de la planta evitando que ramas u hojas obstruyan los orificios de ingreso.

Plus trap® deberá reponerse antes de que se evapore totalmente. El intervalo de tiempo para su reposición podrá variar según la temperatura, humedad, exposición a la luz solar, etc.

Cultivos	Plagas	Dosis	Momento de aplicación
Cítricos: naranjo, mandarino, pomelo. Frutales de carozo: durazno, ciruelo, olivo damasco. Frutas de pepita: peral, manzana, uva. Frutales tropicales: mango, guayaba, etc.	Moscas de la fruta: Ceratitis Capitata, Anastrepha spp.	Mínimo 70 trampas por ha dependiendo de la presión y dinámica de la plaga.	El momento de aplicación, concentración y número se determinará según los umbrales de daño económico a través de trampas atractivas para la detección de moscas adultas. Se sugiere monitorear estas trampas al menos dos veces por semana.

Conservación

Conservar en un lugar fresco y seco, evitando su exposición a la luz solar.

Normas de Seguridad

Mantener lejos del alcance de niños y personas inexpertas. Manipular con guantes, lavar la superficie expuesta con abundante agua y jabón. En caso de ingestión provocar el vómito y consultar de inmediato al médico.

Advertencias

Evite derrames del producto a fin de prevenir focos de atracción fuera de la trampa. Consulte a un profesional de ciencias agrícolas antes de comprar y utilizar este producto.

Susbin S.A. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento.

Susbin S.A. no se hace responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivar de un uso distinto del recomendado del producto.